

Raltegravir (Isentress®)

Raltegravir es un medicamento para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o reducir el riesgo de contraer el VIH. Este medicamento siempre se debe tomar en combinación con otros medicamentos. Nunca debe tomarse solo.

Tome este medicamento exactamente como se le recetó, a la misma hora todos los días.

Cuándo y cómo tomarlo

Tome raltegravir dos veces al día, alrededor de cada 12 horas. Tome este medicamento a la misma hora todos los días, a intervalos regulares.

Puede tomar este medicamento con o sin comida. Tome este medicamento con un vaso lleno de agua. No mueva, corte ni mastique este medicamento.

Olvidar una dosis

Es importante no olvidar ninguna dosis de su medicamento. Olvidar una dosis aumentará el riesgo de contraer el VIH o de generar resistencia a este medicamento.

Si olvida tomar una dosis de su medicamento, tómela tan pronto se acuerde, a menos que ya casi sea hora de su próxima dosis. Si ya es casi hora de su próxima dosis, omita la dosis que olvidó y siga el horario programado. Nunca tome una dosis doble o adicional de su medicamento.

Interacciones con otros medicamentos

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que toma en casa. Esto incluye otros medicamentos con receta, medicamentos de venta libre, plantas medicinales o suplementos. Algunos de estos podrían interactuar con raltegravir.

Raltegravir interactúa con muchos de los medicamentos de venta libre usados para tratar problemas estomacales, como acidez o enfermedad de reflujo gastroesofágico (GERD, en inglés). Algunos de estos medicamentos incluyen:

- Omeprazol (Prilosec®, otros)
- Pantoprazol (Protonix®)
- Lansoprazol (Prevacid®, otros)
- Carbonato de calcio (Tums®)
- Hidróxido de aluminio (Maalox®)

Infórmele a su farmacéutico y a su médico si toma cualquiera de estos medicamentos, u otros medicamentos para reducir la acidez estomacal. Ellos le dirán cómo cómo tomar estos medicamentos de forma segura.

Efectos secundarios

Raltegravir podría causar lo siguiente:

- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Mareos
- Dolor de cabeza
- Problemas para dormir

Cuándo debe llamar a su médico

Llame a su médico de inmediato si se presenta alguno de los siguientes síntomas:

- Reacción alérgica, incluido sarpullido, urticaria, picazón o hinchazón de los labios, lengua o cara
- Problemas para respirar
- Cambios en el ánimo o cambios conductuales
- Dolores musculares
- Temperatura corporal mayor a 100.4° F (38° C) o escalofríos
- Orina de color oscuro