

## Preparación para la alergia al tinte de contraste intravenoso

La prueba o procedimiento que se realizará requiere de un contraste o tinte que tiene yodo. Si tiene alergia al yodo, podría tener que tomar ciertos medicamentos antes de la prueba. Esto es importante para evitar efectos secundarios graves causados por el tinte.

*Si tiene dudas,  
pregunte a  
su médico.*

### Antes de la prueba o procedimiento

#### Por lo menos 24 horas antes de su prueba:

- Dispense las recetas que su médico le ordenó para realizarse la prueba.

#### 13 horas antes de su prueba:

- Tome 50 miligramos (mg) de prednisona por vía oral, como se le recetó.

#### 7 horas antes de su prueba:

- Tome 50 mg de prednisona por vía oral, como se le recetó.

#### 1 hora antes de su prueba:

- Tome 50 mg de prednisona por vía oral, como se le recetó.
- Tome 50 mg de difenhidramina CIH (Benadryl®) por vía oral, como se le recetó.

Tome estos medicamentos con agua. Si tiene instrucciones de no ingerir alimentos sólidos o líquidos antes de la prueba, tome los medicamentos con sorbitos de agua.

**Debe tomar estos medicamentos según lo indicado.** Si no toma estos medicamentos, no podrá realizarse la prueba o procedimiento.